

Condylomata acuminata, Genitale wratten, SOA

Wat zijn het?



Condylomata acuminata zijn roze-rode wratjes van 1-2 mm groot, die soms kunnen samenvloeien tot grotere bloemkoolvormige wratten. De wratten ontstaan op de penis, rond de anus en vagina, en soms ook in de vagina. Zij worden door sexueel contact overgebracht. Andere mogelijkheden van overdracht, zoals gebruik van besmette handdoeken, zijn onwaarschijnlijk doch niet geheel uit te sluiten.

Waar worden ze door veroorzaakt?

Condyloma worden veroorzaakt door virussen uit de familie der humaan papilloma virussen (HPV). Deze familie is zeer uitgebreid. Condylomata worden veroorzaakt door de HPV's type 6, 11, 16 en 18.

Kunnen condylomata acuminata kanker veroorzaken?

Er is een relatie tussen infectie met HPV-16 en HPV-18 en het ontstaan van baarmoederhalskanker. Vrouwen die een infectie met condylomata acuminata hebben doorgemaakt hebben mogelijk een grotere kans om deze vorm van kanker te ontwikkelen dan vrouwen die geen condylomata hebben gehad. Bespreek met de huisarts of

gynaecoloog het controle beleid hiervoor.

Ook is een verhoogd voorkomen van anuskanker beschreven bij patienten met genitale wratten.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Uitwendige condylomata acuminata kunnen over het algemeen snel door de huisarts of dermatoloog zonder nader onderzoek herkend worden. Bij vrouwen zal wel altijd met een speculum de vagina worden onderzocht op condylomata.

Als een infectie wordt vermoed (bijv. omdat de partner van de patient duidelijke afwijkingen heeft) kan de 'azijn'-test worden gedaan. Bij dit onderzoek wordt 5% azijnzuur op de geslachtsdelen aangebracht. Kleine, vlakke wratjes worden dan wit en zo dus zichtbaar worden gemaakt. Deze test is overigens niet 100% betrouwbaar: ook andere aandoeningen kunnen wit aankleuren.

Hoe wordt het behandeld?

podofylline.

Deze etsende stof wordt door de arts aangebracht met een wattenstokje. De huid eromheen wordt eerst beschermd met vaseline. Een uur na aanbrengen dient de podofylline van de wrat met water te worden weggespoeld. Deze behandeling kan wekelijks herhaald worden.

imiquimod (Aldara®)

imiquimod is een stof die het immuunsysteem beïnvloedt en is een effectief middel om condylomen te bestrijden. De crème moet 3 keer per week worden aangebracht en na 6-10 uur worden verwijderd met water en zeep.

podofyllinetoxine.

Deze nauw aan podofylline verwante stof (in crème) kan door de patient zelf worden aangebracht. Ook deze behandeling kan zo nodig gedurende enkele weken wekelijks herhaald worden volgens de aanwijzingen van de voorschrijvend arts.

Vloeibare stikstof.

Bevriezen is vooral effectief als er maar weinig condylomen zijn.

Coagulatie

vooral vaginale condylomata komen voor deze behandeling in aanmerking.

Laser

voor vaginale condylomata.

© 20011, M.E. Leijnse Uitgegeven in eigen beheer. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder onder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.