

## Overtijdbehandeling

Een overtijdbehandeling wordt uitgevoerd als u tussen de 12 en 16 dagen overtijd bent. Met een echo kunnen we zien of u binnen deze termijn valt. Bent u korter overtijd, dan is er een kans dat de behandeling mislukt. In dat geval stellen we de overtijdbehandeling uit.

De behandeling bestaat uit een zuigcurettage met een zeer dun buisje en duurt enkele minuten. Daarna moet u nog een poosje uitrusten.

U kunt er ook voor kiezen dat de overtijdbehandeling met behulp van de abortuspil wordt uitgevoerd, in plaats van een zuigcurettage.

In de klinieken van CASA bestaat de mogelijkheid de zwangerschap te laten afbreken door middel van de zgn. *abortuspil*. Dit is mogelijk tot 7 weken en 6 dagen na het begin van de laatste menstruatie.

Er worden dan twee verschillende medicijnen gebruikt.

Op de eerste dag van de behandeling krijgt u een medicijn dat de werking van het zwangerschapshormoon blokkeert waardoor de zwangerschap losraakt van de baarmoeder. Een of twee dagen later neemt u een ander medicijn. Dit middel veroorzaakt buikkrampen die een aantal uren kunnen aanhouden. Andere bijwerkingen kunnen misselijkheid of diarree zijn. Het bloedverlies kan soms hevig zijn en zorgt ervoor dat het vruchtblaasje kan worden uitgestoten.

**U hoeft deze behandeling niet eerst met een arts te bespreken. Er is ook geen verplichte wachttijd van vijf dagen, zoals bij een abortus.**